

بہتر پیداوار کے حصول کیلئے سفارشات

- کپاس کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لئے بجائی مارچ تیسرا ہفتہ تا مئی تیسرا ہفتہ تک مکمل کر لیں۔ (بلحاظ علاقہ اور موسمی حالات اور درجہ حرارت)
- اگتی کاشت کی صورت میں پودوں کا درمیانی فاصلہ 12-15 انچ، درمیانی کاشت (اپریل) میں 12-19 انچ اور موسمی یا (مئی) چھتی کاشت میں پودوں کا درمیانی فاصلہ 6-9 انچ رکھنے سے بہتر پیداوار لی جاسکتی ہے۔
- کاشت کے لئے زمین کو بھر بھرا اور زم تیار کریں۔
- بیج کی پوری مقدار (5-8) کلوگرام فی ایکڑ استعمال کریں بلحاظ فیصد اگاؤ (Germination % age)۔ یہ مقدار زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ عمومی طور پر پودوں کی اوسط تعداد 22,000-25,000 فی ایکڑ رکھیں۔
- بیج کو "آرٹسٹ" بحساب 8-10 گرام فی کلو بیج سے زہر آلود کرنے کے بعد بجائی کریں۔
- چھدرائی کا عمل 25-18 دن بعد شروع کریں۔
- بجائی کے وقت 3 سے 5 پوری چانچ (سنگل سپرفانسیٹ) ، 1/2 پوری یوریا، 10 کلوگرام بانیو گولڈ یا ہتھیلا دھوا استعمال کریں۔
- کپاس کی بڑھوتری کے دوران 4-6 پوری یوریا استعمال کریں (پہلے پانی کے ساتھ ایک پوری، دوسرے پانی کے ساتھ ایک پوری اور باقی کھاد بھر پور پھول گڈی آنے تک ڈالیں۔ اگتی بجائی میں نائٹروجن کی زیادہ مقدار استعمال کریں۔
- پھول گڈی شروع ہونے پر فلیزیل اوکے 125 گرام بذریعہ اسپرے۔ ہر 15 دن بعد دہرائیں۔
- عنا صغیرہ (ساننگ زنت، نیلسنگرین، فو لیزل اوکے) کا استعمال فصل کو صحت مند اور بھر پور پیداوار میں بہت معاون ہے۔ ان کا بروقت اور متوازن استعمال دی گئی سفارشات کے مطابق کریں۔
- کپاس کی قسم، زمین کی زرخیزی اور موسم کے مطابق نائٹروجن کی مقدار تبدیل کریں، لمبے قد والی اقسام میں نائٹروجن کی مقدار کم استعمال کریں، تاہم فصل کی حالت اور ٹینڈوں کی تعداد کے مطابق نائٹروجن کی مقدار میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔
- آلوئی فصل اور دیگر سبز یا ت والی زمین میں کھادوں کا استعمال صرف ضرورت کے تحت کیا جائے، اس کے علاوہ زرخیز زمینوں میں بھی محتاط انداز میں کھادوں کا استعمال کیا جائے تاکہ غیر ضروری بڑھوتری نہ ہو۔ کھادوں کا استعمال پودے کی ظاہری حالت، موسم، بارش، اور کپاس کی قسم کے مطابق زرعی ماہرین کے مشورے سے استعمال کریں، بی ائی اقسام کا دورانیہ عام اقسام سے نسبتاً لمبا ہوتا ہے، اس لئے بی ائی اقسام کو عناصر صغیرہ اور عناصر کبیرہ کی زیادہ مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لئے زمین کو کھاد دینے کے علاوہ عناصر صغیرہ کا فصل پر اسپرے بھی کیا جاتا ہے، بہتر ہے کہ کیمائی کھادوں اور عناصر صغیرہ کی مقدار کا تعین کرنے کیلئے زمین کا تجزیہ کروایا جائے۔
- پیداواری صلاحیت اور پودے کی خصوصیات بہت سے عوامل جیسا کہ پودوں کی تعداد، پانی اور کھادوں کی کمی بیشی، موسمی حالات اور بیماریوں سے متاثر ہو سکتی ہے۔
- وقت پر کاشت ہی کپاس کی اچھی پیداوار کی ضامن ہوتی ہے، لیکن فصل کا اچھا اگاؤ حاصل کرنے کیلئے زمین کا کم از کم درجہ حرارت 20 ڈگری سنٹی گریڈ ہونا ضروری ہے، کم درجہ حرارت میں بیج کے اگنے کا عمل سست ہو جاتا ہے اور پھپھوندی (Fungus) کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے اگاؤ متاثر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں 15 ڈگری سنٹی گریڈ پر کپاس کے پودے میں خوراک سازی کا عمل بہت سست ہو جاتا ہے، اور بڑھنے والے ننھے پودے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، لہذا بوقت کاشت موسمی صورتحال اور درجہ حرارت کا خاص خیال رکھیں۔



ورائیٹی گائیڈ بی ٹی کپاس 2016

نوٹ: پیداواری صلاحیت کا بڑا انحصار موسمی صورتحال، جزی بوٹیوں کے کنٹرول، زرعی سفارشات کے ساتھ ساتھ فصل کی مناسب دیکھ بھال پر ہے۔



واربل (پیکٹریٹ) لمیٹڈ

کابریٹ، 47-A، انڈسٹریل ایسٹ، ملتان۔
فون: 051-8538401, 8536401
061-6536702
موبائل: 0344-4472082, 0344-4472081
Web: www.allahdingroup.com UAN# 061-111-963-963

سہیل آباد	لاہور شاہ	گوجرانولہ	راولپنڈی	کراچی	پشاور	فیصل آباد	سرگودھا	میرپور	میرٹھ	بہاولپور	بہاول	بہار
محمد رفیق صاحب (0344-4470812)	محمد رفیق صاحب (0344-4470812)	محمد رفیق صاحب (0344-4470812)	محمد رفیق صاحب (0344-4470812)	محمد رفیق صاحب (0344-4470812)	محمد رفیق صاحب (0344-4470812)	محمد رفیق صاحب (0344-4470812)	محمد رفیق صاحب (0344-4470812)	محمد رفیق صاحب (0344-4470812)	محمد رفیق صاحب (0344-4470812)	محمد رفیق صاحب (0344-4470812)	محمد رفیق صاحب (0344-4470812)	محمد رفیق صاحب (0344-4470812)
0344-4470812	0344-4470812	0344-4470812	0344-4470812	0344-4470812	0344-4470812	0344-4470812	0344-4470812	0344-4470812	0344-4470812	0344-4470812	0344-4470812	0344-4470812



ورائٹی گائیڈ بی ٹی کیپس 2016



ورائٹی	پودے کی بناوٹ	گرمی کے خلاف قوت برداشت	وائرس کے خلاف قوتِ مدافعت	وقتِ کاشت	پودوں کا درمیانی فاصلہ	پیداواری صلاحیت	کھادوں کا استعمال
Weal AG-I 	0-3 مونو پوڈیا درمیانی پھیلاؤ دار قد آور	بہت اچھی	بہت اچھی	20 مارچ تا 20 مئی انجی اور موسی کاشت دونوں کیلئے موزوں	9-15 اونچ	موسی: 35-55 من انجی: 45-65 من	بجائی کے وقت: 3-5 بیگ چاند سنگل سہر فاسفیٹ، 1/2 بیگ یوریا، 10 کلو بائیو گولڈ یا 1 تھیلا رجز، 12.5 کلو گیرو پاؤر (ضرورت کے مطابق)۔ بڑھوتری کے دوران: یوریا 4-6 پوری مختلف مراحل میں (ضرورت کے مطابق)، 3-6 لٹرشا ٹنگ زکب یا 12.5 کلو گیرو پاؤر۔ پھول گڈی آنے پر: فوئیزل اوکے (دیگرا جزائے سفیرہ) 125 گرام فی ایکڑ ہر 5 دن بعد اسپرے دہرائیں۔ کم از کم 14 اسپرے کریں۔
Weal AG-II 	0-3 مونو پوڈیا درمیانی پھیلاؤ دار قد آور	بہت اچھی	بہت اچھی	20 مارچ تا 20 مئی انجی اور موسی کاشت دونوں کیلئے موزوں	9-15 اونچ	موسی: 40-55 من انجی: 45-65 من	بجائی کے وقت: 3-5 بیگ چاند سنگل سہر فاسفیٹ، 1/2 بیگ یوریا، 10 کلو بائیو گولڈ یا 1 تھیلا رجز، 12.5 کلو گیرو پاؤر (ضرورت کے مطابق)۔ بڑھوتری کے دوران: یوریا 4-6 پوری مختلف مراحل میں (ضرورت کے مطابق)، 3-6 لٹرشا ٹنگ زکب یا 12.5 کلو گیرو پاؤر۔ پھول گڈی آنے پر: فوئیزل اوکے (دیگرا جزائے سفیرہ) 125 گرام فی ایکڑ ہر 5 دن بعد اسپرے دہرائیں۔ کم از کم 14 اسپرے کریں۔
Weal AG-III 	درمیانی پھیلاؤ دار اور درمیانی قد	بہت اچھی	بہت اچھی	مئی کاشت صرف موسی کاشت کیلئے موزوں گندم کی کاشت کے علاقوں کیلئے انتہائی موزوں	9-15 اونچ	موسی: 35-50 من	بجائی کے وقت: 3-5 بیگ چاند سنگل سہر فاسفیٹ، 1/2 بیگ یوریا، 10 کلو بائیو گولڈ یا 1 تھیلا رجز، 12.5 کلو گیرو پاؤر (ضرورت کے مطابق)۔ بڑھوتری کے دوران: یوریا 3 پوری مختلف مراحل میں (ضرورت کے مطابق)، 3-6 لٹرشا ٹنگ زکب یا 12.5 کلو گیرو پاؤر۔ پھول گڈی آنے پر: فوئیزل اوکے (دیگرا جزائے سفیرہ) 125 گرام فی ایکڑ ہر 5 دن بعد اسپرے دہرائیں۔ کم از کم 14 اسپرے کریں۔
AGC-777 	3-5 مونو پوڈیا	بہت اچھی	بہت اچھی	15 مارچ تا 15 مئی	9-15 اونچ	موسی: 40-55 من انجی: 45-75 من	بجائی کے وقت: 3-5 بیگ چاند سنگل سہر فاسفیٹ، 1/2 بیگ یوریا، 10 کلو بائیو گولڈ یا 1 تھیلا رجز، 12.5 کلو گیرو پاؤر (ضرورت کے مطابق)۔ بڑھوتری کے دوران: یوریا 3-5 پوری مختلف مراحل میں (ضرورت کے مطابق)، 3-6 لٹرشا ٹنگ زکب یا 12.5 کلو گیرو پاؤر۔ پھول گڈی آنے پر: فوئیزل اوکے (دیگرا جزائے سفیرہ) 125 گرام فی ایکڑ ہر 5 دن بعد اسپرے دہرائیں۔ کم از کم 14 اسپرے کریں۔
A-555 	2-3 مونو پوڈیا	بہت اچھی	بہت اچھی	یکم مارچ تا مئی آخری ہفتہ	9-15 اونچ	موسی: 40-55 من انجی: 45-75 من	بجائی کے وقت: 3-5 بیگ چاند سنگل سہر فاسفیٹ، 1/2 بیگ یوریا، 10 کلو بائیو گولڈ یا 1 تھیلا رجز، 12.5 کلو گیرو پاؤر (ضرورت کے مطابق)۔ بڑھوتری کے دوران: یوریا 3-5 پوری مختلف مراحل میں (ضرورت کے مطابق)، 3-6 لٹرشا ٹنگ زکب یا 12.5 کلو گیرو پاؤر۔ پھول گڈی آنے پر: فوئیزل اوکے (دیگرا جزائے سفیرہ) 125 گرام فی ایکڑ ہر 5 دن بعد اسپرے دہرائیں۔ کم از کم 14 اسپرے کریں۔
FH-142 	قد آور	بہت اچھی	بہت اچھی	یکم مارچ تا 15 مئی	9-12 اونچ	موسی: 35-50 من انجی: 50-70 من	بجائی کے وقت: 3-5 یوری چاند سنگل سہر فاسفیٹ، 10 کلو بائیو گولڈ یا 1 تھیلا رجز۔ بڑھوتری کے دوران: یوریا 4-6 پوری مختلف مراحل میں۔ 3-6 لٹرشا ٹنگ زکب۔ پھول گڈی آنے پر: فوئیزل اوکے 125 گرام فی ایکڑ ہر 5 دن بعد اسپرے دہرائیں۔
FH- Lalazar 	درمیانی پھیلاؤ دار ، قد آور	اچھی	اچھی	20 مارچ تا 20 مئی انجی اور موسی کاشت دونوں کیلئے موزوں	9-12 اونچ	موسی: 40-55 من انجی: 45-65 من	بجائی کے وقت: 3-5 بیگ چاند سنگل سہر فاسفیٹ، 1/2 بیگ یوریا، 10 کلو بائیو گولڈ یا 1 تھیلا رجز، 12.5 کلو گیرو پاؤر (ضرورت کے مطابق)۔ بڑھوتری کے دوران: یوریا 4-6 پوری مختلف مراحل میں (ضرورت کے مطابق)، 3-6 لٹرشا ٹنگ زکب یا 12.5 کلو گیرو پاؤر۔ پھول گڈی آنے پر: فوئیزل اوکے (دیگرا جزائے سفیرہ) 125 گرام فی ایکڑ ہر 5 دن بعد اسپرے دہرائیں۔ کم از کم 14 اسپرے کریں۔